



Vermentino B



Nom de la variété en France

Vermentino

Origine

Ce cépage, cultivé en Corse et en Provence depuis très longtemps, semble être originaire d'Italie.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Rolle", "Garbesso" ou "Vermentinu" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. En Italie, le Vermentino peut officiellement être désigné par les noms "Favorita" et "Pigato".

Données réglementaires

En France, le Vermentino est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Espagne, Italie et Malte.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

| | 1958 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| ha | 2106 | 1057 | 833 | 2507 | 3089 | 6333 |

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de couleur vert foncé, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, légèrement gaufré, bullé et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 131 | 232 | 249 | 176 | 200 | 250 | 240 | 235 | 249 |
| Allèle 2 | 149 | 236 | 249 | 178 | 204 | 260 | 248 | 243 | 255 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage assez productif et vigoureux qui doit être taillé court. Un palissage soigné est préférable afin de maintenir la végétation. Ce cépage méridional est bien adapté aux zones chaudes et aux terroirs secs et peu fertiles.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Vermentino est un peu sensible à la pourriture grise, moyennement sensible à la pourriture acide, et assez sensible à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Vermentino donne des vins blancs de qualité, agréables et de belle couleur pâle. Ces vins fins équilibrés et gras présentent une richesse aromatique intéressante (arômes floraux d'aubépine, fruités de poire, ...) même s'ils manquent parfois d'acidité.

Sélection clonale en France

Les quatorze clones agréés de Vermentino portent les numéros 639, 640, 766, 795, 856, 876, 912, 913, 914, 915, 963, 964, 1081 et 1082. Un conservatoire d'une cinquantaine de clones a été mis en place dans le vignoble corse en 2005.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[site web](#), consulté en 2020].

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Origine | Sélection | Fertilité | Niveau de production | Richesse en sucre | Potentiel couleur |
| | Année d'agrément | Références Agronomiques | Poids des grappes | Vigueur | Acidité totale | Structure tannique |
| | Surface en multiplication (année) | | Taille de baies | Sensibilité à la pourriture grise | Intensité aromatique | Aptitudes œnologiques |
| 639 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen à supérieur | inférieure à moyenne | |
| | 1978 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne à supérieure | |
| | 1.62 ha | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Origine | Sélection | Fertilité | Niveau de production | Richesse en sucre | Potentiel couleur |
| | Année d'agrément | Références Agronomiques | Poids des grappes | Vigueur | Acidité totale | Structure tannique |
| | Surface en multiplication (année) | | Taille de baies | Sensibilité à la pourriture grise | Intensité aromatique | Aptitudes œnologiques |
| 640 | Non précisée | ENTAV | inférieure à moyenne | inférieur à moyen | moyenne | |
| | 1978 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | 7.44 ha | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 766 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne | moyen | moyenne | |
| | 1981 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | 0.81 ha | | moyenne | | moyenne | vins aromatiques et bien équilibrés |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 795 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen | inférieure à moyenne | |
| | 1984 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne à supérieure | |
| | 0.71 ha | | moyenne | | moyenne | vins vifs et typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 856 | Haute-Corse | ENTAV | inférieure à moyenne | inférieur à moyen | moyenne à supérieure | |
| | 1984 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | 1.33 ha | | moyenne | | moyenne | vins aromatiques et bien équilibrés |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 876 | Haute-Corse | ENTAV | inférieure à moyenne | inférieur à moyen | moyenne | |
| | 1984 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | 0.24 ha | | moyenne | | moyenne | vins aromatiques et bien équilibrés |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 912 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen à supérieur | moyenne | |
| | 1987 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 913 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne | moyen | moyenne | |
| | 1987 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 914 | Haute-Corse | ENTAV | inférieure à moyenne | inférieur à moyen | moyenne à supérieure | |
| | 1987 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | 0.24 ha | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 915 | Haute-Corse | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen | inférieure à moyenne | |
| | 1987 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | | | moyenne | | moyenne | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 963 | Haute-Corse | ENTAV | | | | |
| | 1990 | Haute-Corse | | | | |
| | | | | | | |

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 964 | Haute-Corse | ENTAV | | | | |
| | 1990 | Haute-Corse | | | | |
| | | | | | | |

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété. Semble présenter un niveau de production inférieur.

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|-------------------------------------|
| 1081 | Haute-Corse | CIVAM Corse - ENTAV | supérieure | moyen | moyenne | |
| | 2004 | Haute-Corse | moyen | moyenne | moyenne | |
| | | | moyenne | | moyenne | vins aromatiques et bien équilibrés |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 1082 | Haute-Corse | CIVAM Corse - ENTAV | supérieure | moyen à supérieur | moyenne | |
| | 2004 | Haute-Corse | moyen | moyenne à supérieure | supérieure | |
| | | | inférieure à moyenne | | moyenne | vins vifs et typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | <i>Origine</i> | <i>Sélection</i> | <i>Fertilité</i> | <i>Niveau de production</i> | <i>Richesse en sucre</i> | <i>Potentiel couleur</i> |
| | <i>Année d'agrément</i> | <i>Références Agronomiques</i> | <i>Poids des grappes</i> | <i>Vigueur</i> | <i>Acidité totale</i> | <i>Structure tannique</i> |
| | <i>Surface en multiplication (année)</i> | | <i>Taille de baies</i> | <i>Sensibilité à la pourriture grise</i> | <i>Intensité aromatique</i> | <i>Aptitudes œnologiques</i> |



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

